

## 預防新型冠狀病毒肺炎的食品安全衛生指引

### 目的：

特區政府十分關注內地新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，因應本澳出現確診病例，故為保障食品安全和降低社區出現感染新型冠狀病毒肺炎的風險，業界有責任採取以下有關個人衛生、環境衛生及食品衛生等預防及控制措施。

### 適用範圍：

所有食品生產經營場所。

### 內容：

#### 1. 食品處理人員的個人衛生

- 勤換工作服，並應經常保持雙手清潔，尤其在下列情況下，必須徹底正確洗手（可參考 GL 002 DSA 2015《食品處理人員正確洗手方法指引》）：
  - 開始處理或再度處理食品前；
  - 處理熟食／即食食品前或處理生食後；
  - 使用食品溫度計前；
  - 佩戴手套前或使用手套後；
  - 咳嗽或打噴嚏後；
  - 觸碰頭髮、眼、口、鼻子等身體外露的部位後；
  - 清潔或處理垃圾後；
  - 如廁後；
  - 飲食後；
  - 抽煙後；
  - 接觸動物後；
  - 其他任何可能導致手部受污染的情況。
- 打噴嚏或咳嗽時，應使用紙巾遮擋口鼻，然後立即洗手；如未能及時使用紙巾，則可以上臂的衣袖遮擋，以免飛沫中的病毒及細菌在食品處理區散播；
- 處理及供應食品時，應正確戴上口罩，以免口水飛沫污染食品及相關器具；
- 盡量使用鉗子、筷子、湯匙等器具輔助，以免直接用手接觸食品（尤

其即食食品)；

- 若出現流涕、腹瀉、嘔吐或發燒等病徵，不應再進行處理食品工作，並應立即向主管報告。

## 2. 用具、設備及環境衛生

- 保持環境整潔、乾爽及空氣流通；
- 應確保抽氣、隔濾系統、排污系統等設施運作有效，且經常清潔和維護；
- 食品處理區內必須至少設置一個標示清晰的員工專用洗手盆，以及附有洗手消毒方法標示；
- 洗手設施經常配置足夠皂液、一次性紙巾或運作良好的乾手機；
- 一次性使用的物品，使用後絕不可再供他人使用，應適當地包裹和棄置；
- 多次使用的物品（包括抹布、毛巾等）和餐飲用具，使用前必須徹底清潔和消毒；（可參考 GL 005 DSA 2017《清潔和消毒餐飲用具的衛生指引》）
- 牆壁、地板、門把手、設施、設備等經常被人觸摸的設施設備，應每日最少清潔消毒一次；
- 在每段工作完畢後（例如：落場），必須徹底清潔消毒場所；
- 應有足夠數量的垃圾桶並須經常蓋好，且適時進行清潔及消毒；
- 地面、牆壁或其他設施如被分泌物或排泄物弄污，應立即清潔消毒：以具吸水力物料作初步清理，再以 1:10 漂白水消毒被污染的表面及鄰近範圍，待漂白水留在表面 30 分鐘後，再以清水沖洗並抹乾；
- 確保渠道通暢，沒滲漏；排水渠有隔氣彎管，至少每星期一次於每一排水口注入半公升的清水，確保管內儲水，以防病原體傳播；消毒時，應把一湯匙 1:100 稀釋漂白水倒進排水口，5 分鐘後再倒清水入內。

## 3. 食品衛生

### 1) 選購

- 應向信譽良好和衛生可靠的供應商購買食品；
- 切勿購買來歷不明的肉類、家禽等食材。

## 2) 配製

- 避免將未經煮熟的食品和已經煮熟的食品放在一起；
- 生的食品和經煮熟的食品應以不同用具（包括砧板、刀和餐具等）來處理；
- 家禽、肉類、雞蛋等食品應要徹底煮熟。

## 3) 供應

- 鼓勵顧客以外賣代替堂食，以減低因市民群集而造成感染的風險；
- 按顧客的需要，主動提供適當分量的調味料、餐具，以避免顧客自取而造成污染；
- 鼓勵顧客在非用餐時戴上口罩。

## 4) 配送

- 應妥善包裹或覆蓋外送食品，以免食品受到污染；
- 配送食品設備（如車箱、保溫箱），使用前必須徹底清潔和消毒；
- 注意配送溫度和時間：
  - 盡可能使用設有溫控設備的車輛配送食品，否則，應使用有足夠保溫效能的容器或保溫箱貯存食品；
  - 盡可能縮短配送過程所需的時間，如選擇最短的送餐路線。  
（可參考 GL 003 DSA 2018《網絡訂餐配送服務的衛生指引》及 GL 012 DSA 2015《運送食品的衛生指引》）

## 4. 食品生產經營者的責任

- 留意員工的身體情況，如在各入口處應設置發熱監測設備，以便發現發燒人士；
- 若發現員工出現流涕、咳嗽、腹瀉、嘔吐或發燒等病徵，不應再進行處理食品工作，並應戴上口罩和儘快就醫；
- 留意特區政府的疫情信息，並配合各項預防措施。

2020年2月